



ROMANO PLUS 25%®

FICHA TÉCNICA

Suspensión oral

Antiparasitario.

N° Registro: F.08.02.N.0779

COMPOSICIÓN

Albendazol micronizado	0.25 g
Sulfato de cobalto	0.01 g
Excipientes c.s.p.	1 ml

USO EN:

Ovinos, camélidos sudamericanos y bovinos.

INDICACIONES DE USO

Romanos Plus 25% esta indicado para:
Nematodos Gastrointestinales: Formas maduras e inmaduras de: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp. Actúa sobre formas hipobióticas de *Ostertagia ostertagi*. Acción sobre adultos: *Oesophagostomum* spp. Acción menor sobre *Bunostomum* spp. **Nematodos pulmonares, *Dictyocaulus viviparus*, Cestodos, *Moniezia* spp. Trematodos, *Fasciola hepática*:** adultos

DOSIFICACIÓN

Nemátodos gastrointestinales, pulmonares y cestodos (5 mg/kg o 1 ml por cada 50 kg de peso vivo. Trematodos, *Fasciola hepática* (10 mg/kg o 2 ml por cada 50 kg de peso vivo.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No reportados

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.
- Usar envases limpios para su dosificación
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.



PERIODO DE RETIRO

Bovinos: carne: 14 días y leche: 3 a 5 días

Ovinos: carne: 14 días y leche: 3 días.

Camélidos sudamericanos: carne: 14 días y leche: 3 días.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.