



VITAPLEX B®

FICHA TÉCNICA

Solución inyectable

Multivitamínico

N° Registro: F.F4.01.N.0005

COMPOSICIÓN

Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina)	10 mg
Vitamina B2 (Riboflavina 5 fosfato sódico)	2 mg
Vitamina B3 (Nicotinamida)	100 mg
Vitamina B5 (Ácido pantoténico)	5 mg
Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina)	5 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	75 ug
Excipientes c.s.p.	1ml

USO EN

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, caninos, felinos y aves.

INDICACIONES DE USO

VITAPLEX® Indicado en el tratamiento y prevención de deficiencias vitamínicas; reconstituyente y estimulante del metabolismo en períodos de "stress", convalecencia, enfermedades y en animales sometidos a excesivo trabajo físico, estimulante del apetito, mejora el sistema inmune, y todas aquellas manifestaciones clínicas dadas por carencia de vitaminas del complejo B. En bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos, felinos y aves.

DOSIFICACIÓN

Vía intramuscular o endovenosa.

- Bovinos, equinos: 10 – 20 ml
- Terneros, potros: 5 – 10 ml
- Porcinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 5 – 10 ml
- Lechones, corderos: 1 – 3 ml
- Caninos, felinos: 1 – 3 ml
- Aves: 0.1 – 1 ml

Se recomienda usar de forma diaria o interdiaria por 5 veces. La dosis y duración del tratamiento pueden variar de acuerdo al criterio del médico veterinario.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar en animales con hipersensibilidad a algunos de los principios activos.
- Si presenta alguna reacción anafiláctica, suspender el tratamiento.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto se encuentre intacto y que sus condiciones de almacenamiento previo al uso hayan sido respetados.
- Limpiar la zona de inyección antes de su administración.
- Usar ropa adecuada durante la manipulación y aplicación del mismo.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.

PERIODO DE RETIRO

No presenta.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.