



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 002

VERSIÓN: V01

# SARNAPLUS 1% L.A.®

Solución Inyectable

Antiparasitario interno y externo

N° Registro: F.54.01.N.0015

### COMPOSICIÓN

Ivermectina	1 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

### USO

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos y caninos.

### INDICACIONES DE USO

Es un antiparasitario de amplio espectro, eficaz frente a una gran variedad de endoparásitos y ectoparásitos en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos y caninos.

### BOVINOS

Endoparásitos:

- Nematodos gastrointestinales: *Haemonchus*, *Ostertagia inclusive estados larvarios*, *Cooperia*, *Trichostrongylus*, *Oesophagostomum*, *Nematodirus*, *Strongyloides*.
- Nematodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*

Ectoparásitos:

- Miasis: *Haematobia irritans*, *Hyporma bovis*, *H lineatum*.
- Piojos masticadores: *Damalinia bovis*.
- Piojos chupadores: *H. eurysternus*, *Linognathus vituli*, *L. pedalis*.
- Garrapatas: *Boophilus microplus*.
- Ácaro de la sarna: *Psoroptes*, *Sarcoptes*.

[www.agrofarma.pe](http://www.agrofarma.pe)

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú  
Teléfono: (511) 258 1347  
Email: [ventas@agrofarma.pe](mailto:ventas@agrofarma.pe)



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 002

VERSIÓN: V01

### OVINOS Y CAPRINOS

Endoparásitos:

- Nematodos gastrointestinales: *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus*, *Trichuris*, *Chavertia*, *Ostertagia*, *Oesophagostomum*., *Trichostrongylus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Cooperia spp.*

Ectoparásitos:

- Ácaros: *Psoroptes ovis*.
- Larvas de mosca: *Mallophagus ovinus*

### CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

Endoparásitos:

- Nemátodos gastrointestinales: *Nematodirus lamae* y *lamanema chavezi*, *Graphinema spp.*, *Spiculoptera spp.* y *Camelostrongylus spp.*, *Nematodirus spathiger*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichuris spp.*, *Capillaria spp.* y *Haemonchus spp.*
- Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus filaria*.

Ectoparásitos:

- Piojos chupadores: *Microthoracius praelongiceps* y *Microthoracius minor*.
- Ácaros: *Sarcoptes scabiei* var. *aucheniae* y *Psoroptes aucheniae*.
- Piojos masticadores: *Damalinea aucheniae*.
- Garrapatas: *Amblyomma parvitarsum*.

### PORCINOS:

Endoparásitos:

- Nematodos gastrointestinales: *Ascaris suum*, *Hyostromylus rubidus*, *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides ransomi*. *Trichuris suis*.
- Nematodos respiratorios: *Dictyocaulus filaria*, *Metastrongylus sp.*

Ectoparásitos:

- Piojos: *Haematopinus suis*.
- Ácaro de la sarna: *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 002

VERSIÓN: V01

### **CANINOS:**

Endoparásitos:

- Nemátodos gastrointestinales: *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Trichuris vulpis*, *Capillaria spp.*
- Parásitos del corazón: *Dirofilaria immitis*,

Ectoparásitos:

- Ácaros: *Otodectes cynotis*, *Sarcoptes scabie*.

### **DOSIFICACIÓN**

Vía subcutánea.

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y caninos: 1 ml/50 kg.

Porcinos: 1.5 mL por cada 50 kg de peso vivo

### **CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO**

- No administrar por vía IM ni IV.
- No se recomienda el uso de este producto en otras especies que no sean las indicadas.
- No se recomienda usar en animales débiles, convalecientes o en situaciones de estrés.
- No se deben administrar en becerros de menos de tres meses de edad, ya que pueden resultar alteraciones en el SNC y daños fatales al esófago.
- No está aprobado para su uso en animales lecheros lactantes o hembras en edad reproductiva.
- No se recomienda utilizar en cachorros menores de 6 semanas de edad.
- En caninos, no usar en razas ni cruces de Collie, Border Collie, Pastor inglés, Pastor ovejero australiano y Galgo afgano.

### **PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO**

- La manipulación del producto debe ser por personal capacitado.
- Evite el contacto directo con la piel.
- Siempre que se trabaje con animales se debe de estar seguro de tenerlos completamente inmovilizados para ello debe ser manejado por personal calificado.
- Por seguridad de la persona, solamente deberá manejar el instrumental veterinario personal capacitado para determinada actividad.

[www.agrofarma.pe](http://www.agrofarma.pe)

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú  
Teléfono: (511) 258 1347  
Email: [ventas@agrofarma.pe](mailto:ventas@agrofarma.pe)



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 002

VERSIÓN: V01

- Se debe aplicar rápidamente para que el animal no se estrese y pueda tornarse agresivo.
- Evitar el contacto con los ojos.

### PERIODO DE RETIRO

Bovinos: 49 días.

Ovinos: 35 días.

Caprino: 56 días.

Camélidos sudamericanos: 60 días.

Porcinos: 28 días.

Este producto no debe ser aplicado en hembras productoras de leche para el consumo humano.

### CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.