



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 004

VERSIÓN: V01

AGROXINA®

Solución Inyectable

Antibiótico

N° Registro: F.82.01.N.0578

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina clorhidrato	100 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

USO

Caninos, felinos, bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.

INDICACIONES DE USO

Agroxina® es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro y tiene eficacia frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, micoplasmas, clamidias, espiroquetas, rickettsias y algunos protozoos. Es utilizado en neumonías bacterianas, bronquitis, enteritis, ántrax, mastitis, endometritis infecciosa, actinomicosis, actinobacilosis, queratoconjuntivitis, leptospirosis, dermatofitos, anaplasma, reducción de abscesos hepáticos, rinitis atrófica, enterotoxemia, ehrlichiosis, brucelosis en caninos, felinos, bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.

DOSIFICACIÓN

- Canino: 0.075 – 0.1 ml/kg (IV) cada 12 horas.
- Felino: 0.075 – 0.1 ml/kg (IV) cada 12 horas.
- Bovino: 0.05 – 0.1 ml/kg (IM) cada 24 horas.
 - o Infecciones tracto respiratorio: 0.2 ml/kg IM cada 24 h.
 - o Ántrax: 0.044 ml/kg (IM, IV) diariamente, no usar en animales sanos vacunados recientemente contra el ántrax.
- Equino: 0.05 – 0.11 ml/kg (IV) cada 12 horas.
- Porcino: 0.075 – 0.1 ml/kg (IM) cada 24 horas.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 004

VERSIÓN: V01

- Ántrax: 0.044 ml/kg (IM, IV) diariamente, no usar en animales sanos vacunados recientemente contra el ántrax.
- Ovino y caprino: 0.06 – 0.11 ml/kg (IV, IM), cada 24 horas.
 - Ántrax: 0.044 ml/kg (IM, IV) diariamente; no usar en animales sanos vacunados recientemente contra el ántrax.

Las dosis y duración de tratamiento se pueden ajustar de acuerdo al criterio del médico veterinario

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar en pacientes hipersensibles al principio activo u otras tetraciclinas.
- En pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática deben usarse con precaución. Se recomienda dosis inferiores a las normales con una adecuada monitorización de la función renal y hepática.
- Evitar su uso en hembras gestantes porque retrasa el desarrollo del esqueleto fetal.
- Evitar su uso en cachorros debido a que decolora los dientes.
- Se debe considerar la monitorización de los niveles séricos si se requiere una terapia a largo plazo.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- No sobrepasar la dosis recomendada.
- En bovino no administrar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.
- En ovino, caprino y porcino no administrar más de 5 ml en el mismo punto de inyección.
- En equinos, este medicamento debe ser diluido y administrado muy despacio. La administración IV rápida puede provocar necrosis tubular renal, hipotensión y colapso.
- Las inyecciones repetidas deben aplicarse en diferentes lugares.
- Las inyecciones intravenosas deben administrarse lentamente durante un periodo de al menos un minuto - Para reducir al mínimo las reacciones locales, se recomienda usar una aguja adecuada, que dependerá de la especie y el peso del animal.
- Evite los vasos sanguíneos y los nervios principales.
- Las inyecciones intravenosas deben administrarse lentamente.
- Medicamento especial de uso veterinario.
- No manipular si es hipersensible a las tetraciclinas.
- Manipular con cuidado para evitar la autoinyección.
- Evite el contacto del producto con piel, ojos y mucosas.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 004

VERSIÓN: V01

- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 26 días.

No administrar en animales de producción de leche para consumo humano.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

