



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 007

VERSIÓN: V01

CURAMICINA PLUS®

Solución Inyectable

Antibiótico - antiinflamatorio

N° Registro: F.71.01.N.0022

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina clorhidrato (equivalente a base)	5 g
Dexametasona sodio fosfato (equivalente a base)	0,05 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

USO

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos, caninos, aves.

INDICACIONES DE USO

CURAMICINA PLUS® está indicado en tratamiento de neumonía y fiebre de transporte compleja, asociados con Pasteurella, Haemophilus, klebsiella, pедера y difteria causadas por Sphaerophorus, enteritis bacteriana (diarrea, causada por Escherichia coli), actinobacilosis causadas por Actinobacillus lignieresii, actinobacilosis, metritis aguda e infecciones de heridas causadas por organismos estafilococales. Se pueden prescribir procedimientos quirúrgicos en algunos tipos de pедера cuando la recuperación no ha sido satisfactoria. Además se indica para el tratamiento del Carbunco bacteriano. Carbunco sintomático o mancha, Septicemia, Hemorrágica, Fiebre de transporte, Neumoenteritis, Mastitis, Leptospirosis, Anaplasmosis, Metritis, Actinomycosis, Actinobacilosis, Metritis, Neumonías, Bronquitis, Peritonitis, Infecciones Genitouterinas, Infecciones Bacterianas secundarias a enfermedades virales. Enfermedades infecciosas en general.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 007

VERSIÓN: V01

DOSIFICACIÓN

Se administra vía parenteral profunda cada 12 horas por 3 – 5 días consecutivos, dependiendo del grado de infección:

- Bovinos, equinos, porcinos, camélidos sudamericanos, ovinos y caprinos: 1 ml/ 10 kg de peso vivo.
- Caninos: 1 ml/5 kg peso vivo.
- Aves: 0.5 ml/kg peso vivo.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar a ponedoras en producción de huevos destinados a consumo humano.
- No usar en animales con insuficiencia renal puede producir toxicosis.
- Una administración endovenosa, demasiado rápida puede causar un colapso del animal, para evitar eso debe ser administrado lentamente o diluido en solución salina normal.
- En cuanto a los efectos generales adversos solamente administrando de 4 a 10 veces la dosis normal de oxitetraciclina + dexametasona aparecen síntomas de intolerancia en forma de trastornos del equilibrio, mareo, vómito, etc.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Como en cualquier inyección intramuscular, puede aparecer alguna irritación tisular local, manifestada a través de una hinchazón transitoria y decoloración en el lugar de aplicación.
- Puede aparecer una irritación pasajera después de la aplicación de inyecciones intramusculares, subcutáneas o endovenosas.
- Puede aparecer una irritación pasajera después de la aplicación de inyecciones intramusculares, subcutáneas o endovenosas, por eso se recomienda no aplicar más de 10 ml por punto de inoculación en ganado adulto y 5 ml en cerdos, ovinos y camélidos adultos.

PERIODO DE RETIRO

- Bovinos, ovinos, porcinos y aves: 28 días.
La leche no deberá destinarse para consumo humano hasta 3 días luego de la última aplicación.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 007
VERSIÓN: V01

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.