



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 008

VERSIÓN: V01

CURAMICINA SOLUBLE®

Polvo

Antibiótico

N° Registro: F.82.70.N.0247

COMPOSICIÓN

Florfenicol	4 g
Excipientes c.s.p.	100 mL.

USO

Porcinos y aves.

INDICACIONES DE USO

CURAMICINA SOLUBLE® Indicado para el tratamiento de infecciones digestivas, genitourinarias, neumonías bacterianas e infecciones respiratorias como *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Proteus indolpositivo*, *Shigella sp.*, *Salmonella sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Citrobacter sp.*, *Bacteroides sp.*, *Actinobacter sp.*, *Haemophilus sp.*, y *Enterococcus spp.* En porcinos y aves.

DOSIFICACIÓN

Porcinos y aves: 10 gramos de producto por 20 kg de peso vivo, o 100 gramos de producto por cada 200 kg de peso vivo, mezclado con el agua de bebida. Cada 24 horas durante 3 a 5 días.

El intervalo y duración del tratamiento puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
- No se recomienda administrar en la época reproductiva en animales destinados para pie de cría.
- No ha quedado demostrado la seguridad del medicamento durante la gestación.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 008

VERSIÓN: V01

- No utilizar en lechones de menos de 2 Kg.
- No administrar en gallinas ponedoras en etapa de producción de huevos para el consumo humano.
- No administrar en animales que estén lactando o estén próximos a parir.
- No administrar conjuntamente con otros antibióticos que se unen a la subunidad 50S (Lincomicina, Eritromicina, tilosina), ya que pueden antagonizar los efectos del Florfenicol y viceversa.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- No fumar ni comer mientras se manipula el producto.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.

PERIODO DE RETIRO

- Porcinos: 28 días.
- Aves: 7 días.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

