



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 009

VERSIÓN: V01

DICLOXIFARM - 10[®]

Solución Inyectable

Antibiótico - antiinflamatorio

N° Registro: F.03.01.N.1360.

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina	10 g
Diclofenaco sódico	0.5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml.

USO

Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

INDICACIONES DE USO

Dicloxifarm - 10[®], indicado para el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias Gram (+), Gram (-), microorganismos de los grupos *Clamidia*, *Mycoplasmataceae*, *Rickettsia* y algunos hongos en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y camélidos sudamericanos. La oxitetraciclina, tienen actividad contra la mayoría micoplasmas, espiroquetas (incluyendo el organismo de la enfermedad de Lyme), Clamidia y Rickettsia. Contra bacterias Gram positivas, las tetraciclinas tienen actividad contra algunas cepas de estafilococos y estreptococos, pero la resistencia de estos organismos está aumentando. Las bacterias Gram positivas que están generalmente cubiertos por tetraciclinas, incluyen *Actinomyces spp.*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium perfringens* y *tetani*, *Listeria monocytogenes* y *Nocardia sp.*. Entre las bacterias Gram negativas que las tetraciclinas por lo general incluir *Bordetella sp.*, *Brucella*, *Bartonella*, *Haemophilus sp.*, *Pasteurella multocida* *Shigella* y *Yersinia pestis*.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 009

VERSIÓN: V01

DOSIFICACIÓN

- Bovinos y porcinos: 1 ml por 10 kg de peso vivo.
- Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.

El tratamiento se realiza cada 24 horas por 3 a 5 días.

Las dosis se adjuntan de acuerdo al criterio de Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a las tetraciclinas y con alteraciones hepáticas.
- No aplicar más de 10 ml por punto de inyección en bovinos y 5 ml en porcinos y ovinos.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.
- Las personas con hipersensibilidad conocida al Diclofenaco o a cualquiera de los excipientes deben evitar el contacto con el medicamento.
- Manipular el medicamento con cuidado para evitar la autoinyección accidental, así como el contacto con la piel y los ojos, tomando precauciones específicas.
- Usar guantes y lavarse las manos tras utilizar el medicamento.
- Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.
- En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el prospecto o la etiqueta.
- No superar la posología ni la duración del tratamiento prescrito.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 009

VERSIÓN: V01

PERIODO DE RETIRO

Carne: 28 días

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.