



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 010

VERSIÓN: V01

ENRORAL-100®

Solución Inyectable

Antibiótico

N° Registro: F.03.32.N.1356

COMPOSICIÓN

Enrofloxacin	10 g
Excipientes c.s.p.	100 mL.

USO

Bovinos, porcinos, ovinos, camélidos sudamericanos, aves, cuyes y conejos.

INDICACIONES DE USO

ENRORAL-10® por su amplio espectro de actividad antimicrobiana está indicada para el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias Gram (+), Gram (-) y micoplasma en bovinos, porcinos, ovinos, camélidos sudamericanos, aves (pollos, gallinas, pavos y patos), cuyes y conejos.

DOSIFICACIÓN

Vía oral a razón de:

- Aves cuyes y conejos: 0.5 ml/litro de agua cada 24 horas por 3 a 5 días consecutivos.
- Bovinos, ovinos, porcinos y camélidos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo cada 24 horas por 3 a 5 días consecutivos

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar a ponedoras en producción de huevos para el consumo humano.
- No administrar en vacas en producción de leche para el consumo humano



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 010

VERSIÓN: V01

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Suspender el tratamiento de bovinos, ovinos, porcinos, camélidos sudamericanos, aves, cuyes y conejos 7 días antes del beneficio (Pavos: 10 días).
- No administrar a ponedoras en producción de huevos para consumo humano
- No administrar a vacas en producción de leche para consumo humano.
- Almacenar a temperatura de ambiente (entre 15 y 30 °C), protegido de la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No transportar el producto junto con alimento o bebidas.

PERIODO DE RETIRO

Suspender el tratamiento en los animales 7 días antes del beneficio.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

