



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 011

VERSIÓN: V01

ENRORAL PLUS®

Solución Inyectable

Antibiótico

N° Registro: F.03.01.N.1808

COMPOSICIÓN

Enrofloxacin Base 100.0 mg.

Excipientes c.s.p. 1.0 ml.

USO

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

INDICACIONES DE USO

ENRORAL PLUS® es un antibacteriano de amplio espectro, indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, alimentario y urinario; artritis, metritis, agalactia (síndrome MMA), septicemia, causadas por bacterias Gram negativas, Gram positivas y micoplasmas.

DOSIFICACIÓN

BOVINOS:

- Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Mycoplasma spp.* Y *Histophilus somni*: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 a 5 días. Vía intramuscular.
- Tratamiento de infecciones del tracto digestivo y septicemia causadas por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Escherichia coli*: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 a 5 días. Vía intramuscular.
- Artritis causada por *Mycoplasma bovis*: 2.5ml/50 kg peso corporal/24 horas/5 días. Vía intramuscular.
- Mastitis aguda causada por *Escherichia coli*: 2.5ml/50 kg peso corporal/24 horas/2 días. Vía intramuscular.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 011

VERSIÓN: V01

CERDOS:

- Tratamiento de Infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma spp.*: 1.25 ml/50 kg/24 horas peso corporal/3 días. Vía intramuscular.
- Tratamiento de síndrome de disgalactia post-parto, mastitis, metritis, agalactia (síndrome MMA) causadas por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*: 1.25 ml/50 kg peso corporal/ 24 horas/3 días. Vía intramuscular.
- Tratamiento de infecciones del tracto urinario causadas por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Escherichia coli*: 1.25 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía intramuscular.
- Tratamiento de infecciones del tracto digestivo causadas por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Escherichia coli*: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía intramuscular.
- Tratamiento de septicemia causada por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Escherichia coli*: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía intramuscular.

OVINO:

- Tratamiento de Mastitis causadas por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía subcutánea.
- Tratamiento de infecciones del tracto digestivo causada por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Escherichia coli*: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía subcutánea.

CAPRINO:

- Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica*: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía subcutánea.
- Tratamiento de mastitis causadas por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli*: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía subcutánea.
- Tratamiento de infecciones del tracto digestivo causada por cepas susceptibles a enrofloxacin de *Escherichia coli*: 2.5 ml/50 kg peso corporal/24 horas/3 días. Vía subcutánea.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 011

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No usar en terneros destinados a faena.
- No administrar a animales con hipersensibilidad a enrofloxacin.
- No administrar a animales con fallas renales, puede disminuir la eliminación de Enrofloxacin.
- No administrar a animales epilépticos o que sufren convulsiones.
- Puede ser usado en el primer trimestre de gestación de la vaca, pero el uso durante los últimos 3 trimestres de la gestación debe basarse en la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.
- Puede ser usado durante la lactancia en vacas.
- En el ovino y caprino no ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.
- En el porcino no ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. El medicamento veterinario puede utilizarse en cerdos durante la lactación.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Usar jeringas nuevas.
- Usar guantes cuando se manipula el producto.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Lavar las manos después del uso.
- En caso de salpicaduras accidentales en los ojos o piel, lavar con abundante agua limpia.

PERIODO DE RETIRO

Bovino:

- Carne: 10 días
- Leche: 4 días



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 011

VERSIÓN: V01

Ovino:

- Carne: 4 días.
- Leche: 3 días.

Caprino:

- Carne: 6 días.
- Leche: 4 días.

Porcino:

- Carne: 13 días

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.