



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 014

VERSIÓN: V01

# QUINOX K®

Solución oral

Anticoccidioso - antibacteriano

N° Registro: F.82.32.N.0501

### COMPOSICIÓN

Sulfaquinoxalina sódica	34 mg
Vitamina K3	2.15 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

### USO

Aves.

### INDICACIONES DE USO

QUINOX K® está indicado para tratamiento y la prevención de infecciones gastrointestinales: coccidiosis intestinal (*Eimeria sp.*), enteritis causadas por bacterias como *Pasteurella multocida* (Cólera aviar), *Escherichia coli* (colibacilosis), *Salmonella gallinarum* (tifoidea aviar) en avicultura. Además cuenta con suplementación de vitamina K3 para evitar hemorragias internas o externas.

### DOSIFICACIÓN

Diluir 2.5 ml de producto en 1 litro de agua de bebida, y administrar 350 ml/kg durante dos o tres días, luego suspender el tratamiento durante 3 días.

Si la infección continúa, diluir 1.5 ml de producto en 1 litro de agua de bebida, y re administrar 350 ml/kg por dos a cuatro días más.

La dosis y duración de tratamiento puede variar según criterio del médico veterinario.



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 014

VERSIÓN: V01

### CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar a animales con procesos hemorrágicos.
- No administrar a animales con anemia, alteraciones hepáticas o renales.

### PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Asegurarse de que los animales tengan libre acceso de agua durante el tratamiento.
- No manipular si es sensible a este producto.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.
- Evite el contacto del producto con piel, ojos y mucosas

### PERIODO DE RETIRO

- Aves: 10 días  
No administrar gallinas productoras de huevos para consumo humano.

### CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.