



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 018

VERSIÓN: V01

DICLOFEN®

Solución Inyectable

Antiinflamatorio No Esteroideo

N° Registro: F.85.01.N.0030

COMPOSICIÓN

Diclofenaco sódico 25 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

USO

Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos.

INDICACIONES DE USO

Diclofen® es un antiinflamatorio no esteroideo, analgésico y antipirético, indicado para procesos inflamatorios, pirexia y dolores fuertes de tipo articulares, tendinosos, óseos (traumas) y musculares como osteoartritis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, cojeras, además de dolores de origen cutáneo, viscerales (cólico), cefalalgia; así como malestar e hipertermia infecciosa en bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos.

DOSIFICACIÓN

Vía: Intramuscular

- Bovino: 0.1 ml/kg p.v.
- Porcino: 0.1 ml/kg p.v.
- Ovino y caprino: 0.04 ml/kg p.v.
- Equino: 0.1 ml/kg p.v.

El tratamiento es una vez al día, por 1 o 3 días, dependerá del criterio del médico veterinario.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 018

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa y/o excipiente.
- No usar en animales con disfunción hepática, cardíaca o renal ni en animales con trastornos hemorrágicos.
- No usar en animales que sufran trastornos gastrointestinales (ej. lesiones ulcerativas), ya que puede empeorar la sintomatología y provocar hemorragias.
- Evitar el uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos; ya que puede existir un riesgo potencial de aumento de la toxicidad renal.
- No administrar a equinos cuya carne o leche se destine al consumo humano.
- No administrar a animales susceptibles de entrar en la cadena alimentaria de la fauna silvestre.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- No manipular si es sensible al principio activo y/o excipiente.
- Utilizar con precaución, con el fin de evitar la autoinyección.
- No comer, fumar o beber mientras se manipule el medicamento.
- Usar equipo de protección personal (guantes) al manipular este producto.

PERIODO DE RETIRO

Bovino

*Carne: 15 días

*Leche: 6 días

Porcino

*Carne: 12 días

Ovino y caprino

*Carne: 10 días

*Leche: 6 días



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 018

VERSIÓN: V01

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

