



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 019

VERSIÓN: V01

DIPIFARM®

Solución Inyectable

Antiinflamatorio No Esteroideo

N° Registro: F.85.01.N.0023

COMPOSICIÓN

Metamizol sódico (Dipirona)	500 mg.
Excipientes c.s.p.	1 ml.

USO

Bovino, equino, porcino y canino.

INDICACIONES DE USO

DIPIFARM® es un analgésico, antipirético, antiespasmódico, y coadyuvante antiinflamatorio de aplicación parenteral. Útil para combatir el dolor, reducir la fiebre y relajar el músculo liso en bovinos, equinos, porcinos y caninos.

DOSIFICACIÓN

Vía intramuscular o intravenosa.

- Bovinos: 2 – 4 mL/50 kg peso corporal. Cada 8 horas.
- Equinos: 2 – 5 mL/50 kg peso corporal. Cada 8 horas.
- Porcinos: 1.5 – 5 mL/50 kg peso corporal. Cada 8 horas.
- Caninos: 0.56 mL/10 kg peso corporal. Cada 8 a 12 horas.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 019

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No usar en casos de hipersensibilidad al Metamizol.
- No administrar en animales con problemas hematológicos.
- No aplicar en animales con insuficiencia hepática.
- No debe administrarse en animales que estén recibiendo tratamientos con fármacos que contengan fenotiazínicos, porque conlleva a hipotermia.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Limpiar la zona de inyección antes de su administración.
- La persona que se encarga del manejo del fármaco debe evitar el contacto con los ojos.
- Usar ropa adecuada durante la manipulación y aplicación del mismo. No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.
- Luego de la aplicación del producto el personal debe lavarse con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que estuvieron expuestas al producto.

PERIODO DE RETIRO

Bovinos y porcinos:

*Carne: 35 días

*Leche: 7 días.

Equinos (dopaje): 36 horas antes de ser sometido al examen de dopaje.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.