



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 020

VERSIÓN: V01

# KETOFARM®

Solución Inyectable

Antiinflamatorio No Esteroideo

N° Registro: F.85.01.N.0017

### COMPOSICIÓN

Ketoprofeno	10 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

### USO

Bovino, equino y porcino

### INDICACIONES DE USO

- **Bovino:** tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, en particular de patologías músculo-esqueléticas como cojeras, artritis y otros traumatismos; paresia puerperal bovina y distocias; mamitis aguda, edema mamario y síndromes cólicos. Tratamiento de soporte en enfermedades del aparato respiratorio.
- **Equino:** tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, en particular de los trastornos músculo-esqueléticos; tratamiento sintomático de la fiebre y cólico equino.
- **Porcino:** tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, en particular del síndrome disgalactia posparto (SDPP, metritis-mastitis-agalactia) de las cerdas. Tratamiento de soporte en enfermedades del aparato respiratorio.

### DOSIFICACIÓN

- **Bovino:** 3 mg de Ketoprofeno/kg peso vivo (equivalente a 3 ml del producto/ 100 kg peso vivo) por vía intramuscular o intravenoso. Una vez al día por 3 días.
- **Equino:** 2,2 mg de Ketoprofeno/ kg peso vivo (equivalente a 1 ml del producto/ 45 kg peso vivo) por vía intravenosa. Una vez al día por 3 a 5 días.
- **Porcino:** 3 mg de Ketoprofeno/kg peso vivo (equivalente a 3 ml del producto/ 100 kg peso vivo) por vía intramuscular. En dosis única

[www.agrofarma.pe](http://www.agrofarma.pe)

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú  
Teléfono: (511) 258 1347  
Email: [ventas@agrofarma.pe](mailto:ventas@agrofarma.pe)



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 020

VERSIÓN: V01

### CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar de forma conjunta con otros antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides, diuréticos o con anticoagulantes.
- El Ketoprofeno muestra un alto grado de unión a proteínas plasmáticas y puede competir con otros fármacos que también presenten un alto grado de unión a proteínas, lo que puede conducir a efectos tóxicos.
- Se deberá evitar la administración simultánea con otros fármacos nefrotóxicos.
- Debido al hecho de que el Ketoprofeno puede inhibir la agregación plaquetaria y causar ulceración gastrointestinal, no debe usarse con otros fármacos que tengan el mismo perfil de reacciones adversas.
- No usar en caso de hipersensibilidad al Ketoprofeno.
- No usar cuando haya evidencias de discrasia sanguínea o trastornos de la coagulación sanguínea.
- No usar en animales que padezcan enfermedades cardíacas, hepáticas o renales.
- No usar en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos debido al posible riesgo de aumentar la toxicidad renal.
- No administrar en yeguas gestantes.

### PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a Ketoprofeno deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- Manipular el medicamento con cuidado para evitar la autoinyección accidental, así como el contacto con la piel y los ojos, tomando precauciones específicas.
- Usar guantes y lavarse las manos tras utilizar el medicamento.
- Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.
- En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrela el prospecto o la etiqueta.
- Romper el envase y la etiqueta para evitar el mal uso del material.



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 020

VERSIÓN: V01

### PERIODO DE RETIRO

Bovino:

- Carne: 4 días
- Leche: cero horas

Equino:

- Carne: 4 días

Porcino:

- Carne: 4 días

Su uso no está autorizado en yeguas en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano.

### CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.