



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 024

VERSIÓN: V01

ALDRIN 50 DP®

Polvo

Antiparasitario externo

N° Registro: F.87.70.I.0155

COMPOSICIÓN

Carbaril	5.0 g
Excipientes c.s.p.	100 g

USO

Caninos, aves, conejos, felinos y cuyes.

INDICACIONES DE USO

ALDRIN 50 DP® es un compuesto en polvo que se emplea como insecticida para el tratamiento y control eficaz de pulgas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* y *pulex irritans*), garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) y ácaros (*Sarcoptes sp.*); parásitos externos que afectan a perros, gatos, aves, cuyes y conejos.

DOSIFICACIÓN

0.1 – 0.15 g por kg. de peso vivo. (0.5 -0.75 g por 5 kg. de peso vivo).

Pulgas: Repetir el tratamiento a los 7 días.

Piojos: Repetir el tratamiento a los 14 días.

Se aplica a contra pelo, sobre todo el cuerpo del animal, masajeando hasta que el producto llegue a la piel.

Usualmente los ectoparásitos están en el ambiente en forma de larvas, luego en su forma adulta pasan a un hospedero (animal doméstico); es por esto que el tratamiento debe ser toda la vida del animal.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 024

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- Evitar que los animales inhalen o ingieran el producto.
- No aplicar después del baño.
- No aplicar sobre heridas o piel lesionada.
- No usar en aves ornamentales.
- No aplicar con viento.
- Los cachorros y gatitos menores de 4 semanas no deben ser tratados con preparaciones Carbaril.
- No utilizar en hembras preñadas.
- No usar en hembras que están dando de lactar por posible intoxicación de crías.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Antes de aplicar el producto, retirar o aislar todo alimento y/o agua de consumo para el animal.
- Evitar el contacto con los ojos y la boca.
- Usar ropa adecuada al aplicar el producto.
- Inmovilizar al animal para evitar posibles accidentes.
- Usar guantes.
- Usar mascarillas.
- Gafas de protección.
- Si el animal presenta signos de intoxicación (salivación, pupilas contraídas, orina frecuente, diarrea, nerviosismo, debilidad muscular, convulsiones) eliminar el insecticida bañándolo inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Después de la manipulación del producto lavarse con abundante agua y jabón.
- Quítese la ropa y el calzado contaminados.

PERIODO DE RETIRO

- Carne: 7 días
- Leche: 24 horas



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 024

VERSIÓN: V01

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.