



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 025

VERSIÓN: V01

AMITRAX 20.8%®

Concentrado emulsionable
Antiparasitario externo
N° Registro: F.87.73.N.0195

COMPOSICIÓN

Amitraz	208 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

USO

Bovinos.

INDICACIONES DE USO

AMITRAX 20.8%® está indicado para el control de garrapatas comunes *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y *Amblyomma cajennense* en bovinos.

DOSIFICACIÓN

Bovinos: 1 ml por cada 1 litro de agua. Bañar con 4 a 5 litros por animal.
Frecuencia:

- *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*: 21 días
- *Amblyomma cajennense*: 7 días.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa.
- No usar en animales menores de tres meses.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 025

VERSIÓN: V01

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Preparar y utilizar la dilución en un lugar bien ventilado.
- No comer, beber ni fumar durante la utilización del producto. Tras la utilización del producto, lavarse bien las manos.
- Utilizar ropa protectora (guantes, mandil, mascarilla) a la hora de utilizar el producto.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto accidental con los ojos, lavar con abundante agua.
- No arrojar el producto a fuentes de agua, ya que es tóxico en peces.
- En caso de intoxicación el tratamiento debe ser sintomático.

PERIODO DE RETIRO

Bovino:

*Carne: 14 días.

*Leche: 24 horas.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.