



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 026

VERSIÓN: V01

# BIOSANTEL®

Solución oral

Antiparasitario interno

N° Registro: F.08.32.N.0879

### COMPOSICIÓN

Closantel (Base)	10 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

### USO

Bovinos, equinos, ovinos, camélidos sudamericanos.

### INDICACIONES DE USO

#### Bovinos

- Nematodos: Adultos y formas larvarias L3 y L4 de: *Haemonchus spp.*, *Bunostomun spp.*, *Oesophagostomun spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Chabertia spp.*
- Tremátodos: *Fasciola hepatica*, *Paramphistomum spp.*
- Ectoparásitos: *Dermatobia hominis*, *Haematopinus eurytarnus*, *Solenopotes capillatus*, *Linognathus vituli* y preventivo de la *Cochliomyia hominivorax* y de la *Callitroga spp.*

#### Ovinos, camélidos sudamericanos:

- Nematodos: Adultos y formas larvarias L3 y L4 de: *Haemonchus spp.*, *Bunostomun spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Cooperia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Ostertagia spp.*
- Tremátodos: *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, *Paramphistomum spp.*
- Ectoparásitos: *Melophagus ovinus*, *Oestrus ovis* y preventivo de la *Cochliomyia spp* o *Callitroga spp.*

#### Equinos:

- Endoparásitos: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, *Strongylus edentatus*, *Triodontophorus spp.*, *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Anoplocephala perfoliata*; estadíos larvarios de *Gasterophilus nasalis*, *Gasterophilus intestinalis*, *Strongylus vulgaris*.

[www.agrofarma.pe](http://www.agrofarma.pe)

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú  
Teléfono: (511) 258 1347  
Email: [ventas@agrofarma.pe](mailto:ventas@agrofarma.pe)



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 026

VERSIÓN: V01

### DOSIFICACIÓN

#### Bovino:

- Fasciolosis y nematodosis gastrointestinales: 5 ml del producto por cada 100 kg de peso vivo, en dosis única.
- Hipodermosis: 10 ml del producto por cada 100 kg de peso vivo, en dosis única

#### Ovino y camélidos sudamericanos:

- Estrosis y nematodosis gastrointestinales: 2.5 ml del producto por cada 50 kg de peso vivo, en dosis única
- Fasciolosis: 5 ml del producto por cada 50 kg de peso vivo, en dosis única

#### Equino:

- 5 ml del producto por cada 50 kg de peso vivo, en dosis única.
- Las dosis se ajustan de acuerdo al criterio del médico veterinario.

### CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No reportados.

### PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.
- Usar envases limpios para su dosificación.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.

### PERIODO DE RETIRO

#### Bovino:

Carne: 28 días.

Leche: No autorizado para emplear en ganado vacuno productor de leche para consumo humano, incluso durante el secado. No emplear durante la segunda mitad de la gestación en novillas destinadas a la producción de leche para consumo humano.



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 026

VERSIÓN: V01

### **Ovino:**

Carne: 42 días.

Leche: No autorizado para emplear en ovejas que producen leche para consumo humano, incluso durante el secado. No emplear en el plazo de 1 año antes del primer parto en ovejas destinadas a la producción de leche para consumo humano.

### **CONSERVACION DEL PRODUCTO**

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.