



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 031

VERSIÓN: V01

# ECTOFARM 100®

Solución tópica

Antiparasitario externo

N° Registro: F.87.37.N.0044

### COMPOSICIÓN

Fipronil	1 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

### USO

Bovinos, equinos, camélidos sudamericanos, ovinos, caprinos, cuyes.

### INDICACIONES DE USO

ECTOFARM 100®, antiparasitario de uso externo recomendado para el control y prevención prolongada de infestaciones por la mosca de los cuernos, garrapatas, dermatobia (tupe o nuca), piojos masticadores, chupadores y miasis en rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos) en equinos, contra pulgas, piojos y garrapatas en cuyes. Es de especial relevancia su acción sobre poblaciones de mosca de los cuernos (hasta por 6 semanas), es eficaz contra las pulgas y piojos con un periodo de actividad hasta de 3 meses y garrapatas (hasta por 4 semanas) resistentes a otros parasiticidas.

### DOSIFICACIÓN

Se administra tópicamente a lo largo de la línea dorsal en la banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola a razón de:

En rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos) y equinos: Aplicar 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.

En cuyes 0.5 ml por cada kg de peso vivo, a lo largo de la línea dorsal.

ECTOFARM 100® es de dosis única, mata las moscas de los cuernos por 1 mes y medio, pulgas y piojos por 3 meses y las garrapatas hasta por lo menos 1 mes.

Pero se recomienda usar una vez al mes solo cuando exista un alto riesgo de reinfestación.

[www.agrofarma.pe](http://www.agrofarma.pe)

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú  
Teléfono: (511) 258 1347  
Email: [ventas@agrofarma.pe](mailto:ventas@agrofarma.pe)



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 031

VERSIÓN: V01

### CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No se ha descrito

### PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Evitar el contacto de los ojos.
- Usar guantes durante el tratamiento.
- Lavarse las manos después del uso. Destruir los envases vacíos para luego envolverlos en bolsas
- para su eliminación final lejos del alcancé de los animales.

### PERIODO DE RETIRO

En el caso de bovinos es para uso exclusivo de bovinos de carne.

No faenar a los animales de producción de carne para consumo humano hasta 100 días después de la última aplicación.

No administrar en bovinos ni otros animales cuya leche se destine para consumo humano.

No administrar vaquillonas destinadas a la producción de leche durante 3 últimos meses previos al parto.

### CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.