



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 032

VERSIÓN: V01

ECTOFARM PLUS®

Solución externa – Pour On
Antiparasitario interno y externo
N° Registro: F.09.62.N.0358

COMPOSICIÓN

Fipronil	10 mg
Abamectina	5 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

USO

Bovinos.

INDICACIONES DE USO

Ectofarm Plus® es un producto antiparasitario de fácil aplicación, indicado para el control y erradicación de parásitos internos (gusanos nemátodos y gastrointestinales) y parásitos externos (piojos, pulgas, moscas, ácaros y garrapatas) en bovinos. En bovinos contra garrapata (*Rhipicephalus microplus*), mosca del cuerno (*Haematobia irritans*), piojos masticadores (*Damalinea bovis*), piojos chupadores (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*), larvas de las moscas: *Dermatobia hominis* (gusano del cuerno), *Cochliomyia hominivorax* (miasis cutánea), *Hypoderma spp.* y ácaro de la sarna (*Chorioptes bovis*), nemátodos gastrointestinales: *Ostertagia ostertagi*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axe*, *Nematodirus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides papillosus*, *Trichuris spp.*

DOSIFICACIÓN

Vía tópica, administrar a lo largo de la línea dorsal en la banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola, a razón de: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 032

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No usar en vacas en producción de leche, ni en gestantes 3 meses antes del parto.
- No utilizar en animales enfermos (enfermedad sistémica, fiebre) o convalecientes.
- No aplicar sobre los ojos ni cara del animal, puede causar irritación.
- Consultar con un veterinario antes de usar en animales medicados.
- No debe ser aplicado en animales, 48 horas antes, ni 48 horas después del baño.
- No aplicar conjuntamente con fármacos que pueden incrementar la actitud del GABA como el barbital.
- Los animales o personas que con hipersensibilidad a alguna sustancias activas deben evitar el contacto con el medicamento.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Este medicamento puede causar sensibilización cutánea, reacciones alérgicas y ligera irritación ocular en humanos.
- Se recomienda uso de guantes protectores.
- Evitar contacto directo con el punto de aplicación.
- No tener contacto con animales recién tratados hasta que el producto se seque.
- Se recomienda que el medicamento se aplique al aire libre o en un lugar bien ventilado.
- No fumar, beber o comer mientras se manipule el medicamento.
- Lavarse las manos después de usar el medicamento.
- Una vez que usado el producto, desechar inmediatamente. En caso de que se conserve el producto, debe ser en su envase.
- En caso de derrame accidental sobre la piel u ojos, lavarse instantáneamente con agua y jabón.
- En caso de algún efecto adverso después de la exposición del medicamento, consulte con un médico.
- No contaminar corrientes de agua con restos de este producto; ya que es tóxico para peces e invertebrados acuáticos, además de abejas.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 032

VERSIÓN: V01

PERIODO DE RETIRO

Bovinos: Carne: 100 días

No usar en vacas cuya leche sea destinada para consumo humano.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.