



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 044

VERSIÓN: V01

# TRIFARM 12.5%®

Suspensión oral

Antiparasitario interno

N° Registro: F.08.02.N.0857

### COMPOSICIÓN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Triclabendazole    | 12.5 g   |
| Excipientes c.s.p. | 100.0 ml |

### USO

Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y bovinos.

### INDICACIONES DE USO

TRIFARM 12.5 %® indicado para bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos. Acción sobre *Fasciola hepática* (Formas adultas y jóvenes inmaduras) desde las 2 semanas siguientes a la infestación.

No tiene acción sobre nemátodos.

### DOSIFICACIÓN

- Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 0.08 ml de producto (equivalente a 10 mg de Triclabendazole micronizado) por Kg de peso vivo.
- Bovinos: 0.096 ml de producto (equivalente a 12 mg de Triclabendazole micronizado) por Kg de peso vivo.

El tratamiento es a dosis única.



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 044

VERSIÓN: V01

### CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No reportados

### PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.
- Usar envases limpios para su dosificación.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.

### PERIODO DE RETIRO

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 28 días.

No utilizar en lecheras en producción

### CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.