



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 046

VERSIÓN: V01

OXITOFARM®

Solución inyectable

Hormona inductor de parto

N° Registro: F.16.01.N.0200

COMPOSICIÓN

Oxitocina sintética 10.0 U.I.

Excipientes c.s.p. 1.0 ml

USO

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, caninos y felinos.

INDICACIONES DE USO

OXITOFARM® es utilizado para la inducción o la mejora de las contracciones uterinas en el parto, el tratamiento de retención de placenta en posparto y metritis, involución uterina después de la corrección manual de prolapso uterino en los perros, y en el tratamiento de agalaxia. Induce el flujo de leche.

DOSIFICACIÓN

VACAS Y YEGUAS:

- Inducción de contracciones uterinas durante el parto: 30 UI de Oxitocina (equivalente a 3 ml del producto), vía IM. Repetir después de 30 minutos si fuese necesario.
- Retención de placenta: 40 – 60 UI de Oxitocina (equivalente a 4 - 6 ml del producto), vía IM. Repetir cada 2 horas si fuese necesario.
- Inducción al flujo leche (solo vacas): 10 – 20 UI de Oxitocina (equivalente a 1 - 2 ml del producto). Dosis única.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 046

VERSIÓN: V01

CERDAS:

- Inducción de contracciones uterinas durante el parto; 10 UI de Oxitocina (equivalente a 1 ml del producto), vía IM. Repetir después de 30 minutos si fuera necesario
- Retención de placenta: 20 – 30 UI de Oxitocina (equivalente a 2 - 3 ml del producto), vía IM. Repetir cada 2 horas si fuese necesario.
- Tratamiento del síndrome de agalactia: 20 – 50 de Oxitocina (equivalente a 2 - 5 ml del producto), vía IM.
- Inducción al flujo de leche: 5 – 20 UI de Oxitocina (equivalente a 0.5 - 2 ml del producto). Dosis única.

OVEJAS Y CABRAS:

- Inducción de contracciones uterinas durante el parto: 30 - 50 UI de Oxitocina (equivalente a 3 – 5 ml del producto), vía IM. Repetir después de 30 minutos si fuese necesario.
- Retención de placenta: 10 – 20 UI de Oxitocina (equivalente a 1 - 2 ml del producto), vía IM.
- Metritis post parto: 5 - 10 UI de Oxitocina (equivalente a 0.5 – 1 ml del producto), vía IM. Repetir 3 – 4 veces al día, por 2 – 3 días.

PERRAS:

- Inducción de contracciones uterinas durante el parto: 1 - 5 UI de Oxitocina (equivalente a 0.1 - 0.5 ml del producto), vía IM. Repetir después de 30 minutos si fuese necesario.

GATAS:

- Inducción de contracciones uterinas durante el parto: 5 UI de Oxitocina (equivalente a 0.5 ml del producto), vía IM. Repetir en intervalos de 15 a 20 minutos.

Las dosis se ajustan de acuerdo al criterio del médico veterinario.





FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 046

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- La oxitocina está contraindicada en animales con distocia por presentación anormal del feto, a menos que se haga corrección.
- La oxitocina también está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la misma.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a Oxitocina deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- Manipular el medicamento con cuidado para evitar la autoinyección accidental, así como el contacto con la piel y los ojos.
- Usar guantes y lavarse las manos tras utilizar el medicamento.
- Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.
- En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrela el prospecto o la etiqueta.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 0 días

Leche: 0 días

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.