



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 050

VERSIÓN: V01

CALIFOS®

Solución inyectable

Reconstituyente

N° Registro: F.75.01.N.0168

COMPOSICIÓN

Gluconato de calcio	250 mg
Cloruro de magnesio	60 mg
Butafosfan	4 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

USO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.

INDICACIONES DE USO

CALIFOS®, suplemento mineral indicado para tratar y prevenir enfermedades metabólicas - nutricionales como la osteomalacia, raquitismo, hipocalcemia y los estados de deficiencia de calcio cuando se presenta paresia puerperal/fiebre de la leche antes, durante y después del parto o durante la lactación. Además, usado en eclampsia y tetania (tetania de la gestación, del parto y de lactancia, tetania de transporte, tetania pastosa, tetania de establo). Está adicionado con Cloruro de magnesio y Butafosfan (fosfato orgánico) para casos de hipomagnesemia e hipofosfatemia.

DOSIFICACIÓN

Bovino, equino, ovino, caprino, porcino: 1 ml/kg.

Canino y felino: 0.5 ml/kg.

Repetir la administración cada 12 horas, si es necesario. Según el criterio del médico veterinario.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 050

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- La administración intravenosa debe ser lenta.
- La solución debe alcanzar la temperatura corporal del animal antes de ser administrada en grandes cantidades.
- Si durante la administración el paciente presenta taquipnea, bradicardia o taquicardia interrumpir la administración.
- Debe administrarse con precaución en animales con insuficiencia renal, por riesgo de acumulación de magnesio.
- No usar en animales hiperexcitados.
- No administrar en animales con problemas cardíacos.
- No administrar en animales con hipercalcemia, hipermagnesemia e hiperfosfatemia.
- No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o algún excipiente.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Administrar con precaución para evitar la autoinyección accidental. En caso suceda, consulte con un médico inmediatamente.
- No comer, fumar o beber mientras manipule esta solución inyectable.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a los excipientes deben administrar la solución con precaución.

PERIODO DE RETIRO

No presenta.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.