

FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 054 VERSIÓN: V01

ENGORVITAM B12 ORAL®

Suspensión oral Multivitamínico

N° Registro: A.30.07.N.0009

COMPOSICIÓN

Fósforo45 gMagnesio80 mgCobalto20 mgBiotina1 mg

Vitamina A 10 000 000 UI
Vitamina E 6 000 UI
Vitamina C 30 g
Vitamina B12 10 mg
Excipientes c.s.p. 1000 ml

USO

Camélidos sudamericanos, caninos, aves, bovinos, ovinos, equinos, caprinos y porcinos.

INDICACIONES DE USO

ENGORVITAM B12 ORAL®, multivitamínico compuesto por minerales y vitaminas, considerado promotor de producción; intervienen en el mantenimiento de las funciones orgánicas en todos los procesos productivos de los animales domésticos, previniendo cualquier manifestación patológica por la carencia de ellos en la alimentación; estimula el apetito de animales en proceso de engorde, recupera el apetito en animales que han sufrido alguna enfermedad infecciosa; mejora la cáscara del huevo; recupera las aves en proceso de muda; mejora el metabolismo del calcio y fósforo en animales en crecimiento y en casos de hipocalcemia y raquitismo, incrementa la fertilidad y vitalidad en reproductores.

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú Teléfono: (511) 258 1347

Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 054 VERSIÓN: V01

DOSIFICACIÓN

TIPO DE GANADO	DOSIFICACIÓN
Bovinos y equinos adultos	100-150 ml/ día x 7 días
Terneros y potrillos	50ml / día x 7 días
Ovinos, caprinos y camélidos	50ml / día x 7 días
sudamericanos adultos	
Ovinos, caprinos y camélidos	10 ml / día x 7 días
sudamericanos jóvenes	
Marranas en lactación	50-100 ml/día x 21 días
Lechones destetados	10-20 ml/día x 10 días
Verracos	100-150 ml/día x 5 días
Gallinas ponedoras	0.2 – 0.5 ml/día x 5 días
Broilers	0.2 – 0.5 ml/día x 5 días
Pollos BB	0.1 – 0.2 ml/día x 5 días
Pavos	3 – 5 ml/día x 5 días
Patos	0.5 – 2 ml/día x 5 días
Perros mayores de 10 kg	5 ml/día x 5 días
Perros hasta 10kg	3 ml/día x 5 días
Cachorros	1 ml/día x 5 días

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No presenta.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- La administración de cantidades excesivas de vitamina A durante períodos prolongados puede llegar hasta el estado de toxicidad conocido como hipervitaminosis A.
- El tratamiento consiste en la interrupción de la administración de la vitamina, que lleva rápidamente al retroceso de los trastornos, salvo la hiperostosis que dura algunos meses.
- El producto no debe ser aplicado vía parenteral.
- No administrar en casos de hipertiroidismo.
- Lavarse las manos y cara con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño.
- Lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo.
- Lavar aparte la ropa y el equipo usados.
- No dañar la etiqueta durante todo este proceso.

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú Teléfono: (511) 258 1347 Email: ventas@agrofarma.pe

www.agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 054 VERSIÓN: V01

PERIODO DE RETIRO

No presenta.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Email: ventas@agrofarma.pe