



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 058

VERSIÓN: V01

IVERFARM + AD3E®

Solución inyectable

Antiparasitario + multivitamínico

N° Registro: F.09.01.I.0248

COMPOSICIÓN

Ivermectina	1.2 g
Vitamina	5 000 000 UI
Vitamina D3	40 000 UI
Vitamina E	1 000 UI
Excipientes c.s.p.	100 ml

USO

Bovinos, porcinos y ovinos.

INDICACIONES DE USO

IVERFARM + AD3E®, antiparasitario interno y externo con vitaminas para bovinos, ovinos y porcinos. Para el control de Nematodos gastrointestinales (adultos y L4) y pulmonares: *Haemonchus contortus* y *placei*, *Ostertagia ostertagi* y *spp*, *Trichostrongylus axei* y *spp.*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum radiatum*, *Bunostomum phlebotomum*; *Dictyocaulus viviparus*.

Piojos chupadores: *Lignosnatus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*.

Ácaros de sarna: *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes bovis*.

Garrapata: *Boophilus microplus*.

La asociación de Ivermectina con vitaminas A, D3, E ayuda al mantenimiento basal y funcional de los animales, que generalmente son desbalanceados por el daño parasitario.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 058

VERSIÓN: V01

DOSIFICACIÓN

Bovinos y ovinos: 1 ml cada 60 kg de peso vivo. Dosis única. Vía subcutánea.

Porcinos: 1 ml cada 40 kg de peso vivo. Dosis única. Vía subcutánea.

Nota: Dosis del producto, intervalo y duración de tratamiento pueden variar según el criterio del médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar en casos de hiperparatiroidismo.
- Limpiar la zona de inyección antes de su administración.
- No usar en casos de hipersensibilidad a la ivermectina.
- No usar en vacas ni en ovejas lecheras en lactación que producen leche para el consumo humano.
- No usar en vacas lecheras en secado, incluidas las novillas lecheras gestantes, ni en ovejas lecheras en secado en los 60 días antes del parto.
- No administrar por vía intravenosa o intramuscular.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Limpiar la zona de inyección antes de su administración.
- La persona que se encarga del manejo del fármaco debe evitar el contacto con los ojos.
- Usar ropa adecuada durante la manipulación y aplicación del mismo.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.
- Luego de la aplicación del producto el personal debe lavarse con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que estuvieron expuestas al producto.
- Este producto es altamente tóxico para los microorganismos acuáticos, no verter en fuentes de agua. Se recomienda la incineración de sus envases.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 058

VERSIÓN: V01

PERIODO DE RETIRO

Bovinos: 49 días

No usar en vacas lecheras que producen leche para el consumo humano. No usar en vacas lecheras en secado, incluidas las novillas lecheras gestantes, en los 60 días antes del parto.

Ovinos: 42 días

No usar en ovejas lecheras que producen leche para el consumo humano. No usar en ovejas destinadas a la producción de leche para el consumo humano, en los 60 días antes del parto.

Porcinos: 28 días.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

