



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 073

VERSIÓN: V01

CURAMISULFIN K[®]

Polvo

Anbitiótico

N° Registro: F.03.70.N.1603

COMPOSICIÓN

Trimetoprim	4.0 g
Sulfadiazina sódica	20.0 g
Vitamina K3	1.0 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

USO

Camélidos sudamericanos, caninos, aves, bovinos, ovinos, equinos, caprinos, conejos, felinos y porcinos.

INDICACIONES DE USO

CURAMISULFIN K[®] es una sulfa potenciada (de amplio espectro) a la que se le ha adicionado la vitamina K (favorece la formación y regeneración de la piel y mucosas, regulación del crecimiento óseo y coagulación); la cual está indicada en el tratamiento de enfermedades infecciosas de los tractos digestivo y respiratorio, septicemia, infecciones secundarias, peritonitis, mastitis y metritis producidas por *Actinomyces spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Aeromonas spp.*, *Bordetella spp.*, *Corynebacterium spp.*, *E. coli*, *Fusiformis spp.*, *Klebsiella spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Moraxella bovis*, *Nocardia spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Samonella spp.*, *Shigella spp.*, *Staphylococcus spp.* (Incluyendo cepas pencilasa +), *Streptococcus spp.* (Incluyendo enterococos y diplococos), *Campylobacter spp.*

Específicamente son particularmente indicadas para las siguientes enfermedades:

- Bovinos: pietín, coccidiosis, difteria de los terneros, poliartritis, infecciones respiratorias.
- Equinos: infecciones del tracto respiratorio superior, poliartritis en el potrillo.
- Ovinos: coccidiosis, pietín, enteritis.
- Porcinos: neumonía, rinitis.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 073

VERSIÓN: V01

- Perros y gatos: infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel, infecciones del tracto respiratorio.
- Conejos: coccidiosis.
- Aves: Enfermedad respiratoria crónica, Coriza infecciosa aviar, salmonelosis, coccidiosis, pasteurelisis, colibacilosis, cólera aviar.

DOSIFICACIÓN

Aves, conejos, caninos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos, equinos, felinos: 15 – 24 mg de Curamisulfin por Kg de peso vivo/ 3 a 5 días.

- En el alimento se puede administrar de 300 a 500 g por tonelada.
- Tomar 100 g de Curamisulfin (Equivalente a 20 g de Sulfadiazina sódica sódica, 4 g de Trimetoprim) agregar en 100 litros de agua de bebida, agitar para homogeneizar y colocar en los bebederos. Renovar el agua de bebida diariamente.

Las dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- Puede producir síntomas de intolerancia gastrointestinal, luego de la administración oral.
- Produce reacciones alérgicas a dosis altas durante períodos prolongados de tiempo.
- En algunos animales se han observado síndromes hemorrágicos.
- No usar en animales con insuficiencia renal aguda o glomerulonefritis.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Usar recipientes limpios.
- Al preparar verificar que esté completamente disuelto en el agua.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 073

VERSIÓN: V01

PERIODO DE RETIRO

- Aves de carne, bovinos de carne, ovinos, caprinos, equinos, caninos, felinos, camélidos sudamericanos, equinos: 10 días.
- Porcinos: 15 días.

No administrar a ponedoras, ni lecheras

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.