



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 074

VERSIÓN: V01

# RANIZOL F®

Suspensión oral

Antiparasitario interno

N° Registro: F.08.36.N.0862

### COMPOSICIÓN

Rafoxanide	10.0 g
Albendazole	10.0 g
Cobalto (Sulfato)	100 mg
Metionina	0.70 g
Lisina	0.47 g
Excipientes c.s.p.	100.0 ml

### USO

Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y bovinos

### INDICACIONES DE USO

RANIZOL F®, indicado para el control y tratamiento de las formas adultas y juveniles de *Fasciola hepática*, nematodos gastrointestinales: *Ostertagia sp.* (incluidas las larvas inhibidas o hipobióticas), *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Bunostomum spp.*, *Chavertia ovina*, *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae*, *Trichuris spp.*, Nematodos pulmonares: *Dyctiocaulus spp.*, tenias: *Moniezia spp.*, larvas de *Oestrus ovis* (gusano de la nariz).

La combinación con cobalto y aminoácidos estimula la síntesis de B12, mantiene las funciones orgánicas, previene anemias y mejora el nivel reproductivo. Tiene efecto energizante y estimula el apetito en el animal parasitado.

[www.agrofarma.pe](http://www.agrofarma.pe)

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú  
Teléfono: (511) 258 1347  
Email: [ventas@agrofarma.pe](mailto:ventas@agrofarma.pe)



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 074

VERSIÓN: V01

### DOSIFICACIÓN

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo. (10mg/kg de Rafoxanide y 10 mg/kg de Albendazole).

### CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No posee a dosis recomendadas.

### PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.
- Usar envases limpios para su dosificación
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.

### PERIODO DE RETIRO

Carne: 28 días

- No utilizar en lecheras en producción
- No administrar a equinos destinados al consumo humano
- No administrar a vacas en los primeros 45 días de gestación o hasta 45 días después de haber retirado los toros del servicio
- No administrar a ovejas en los primeros 45 días de gestación o hasta 45 días después de haber retirado los carneros del servicio

### CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.