



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 077

VERSIÓN: V01

TRISULFIN®

Suspensión inyectable

Antibiótico

N° Registro: F.03.01.N.1773

COMPOSICIÓN

Sulfadoxina	200 mg
Trimetoprim	40 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

USO

Bovino, porcino y equino.

INDICACIONES DE USO

TRISULFIN® es una combinación de sulfamidas con diaminopirimidinas donde se aumenta el espectro de acción siendo hoy una de las formas más usadas en terapéutica antibacteriana especialmente en la de grandes animales (bovinos, porcinos y equinos) para el tratamiento de enfermedades producidas por bacterias (Gram positivo como *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterococcus spp.*, y *Clostridium spp.*; y gramnegativas como *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, enterobacterias, *Pseudomonas*, *Helicobacter spp.*, *Mycoplasma spp.*, *histophilus somni*) y por protozoarios (coccidia y toxoplasma); en casos de infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores (bronquitis, neumonía, pleuroneumonía), infecciones de vías urinarias, infecciones de órganos genitales de hembras y machos, infecciones gastrointestinales (coccidiosis, giardia, colibacilosis, toxoplasmosis, actinobacilosis).

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 077

VERSIÓN: V01

DOSIFICACIÓN

Bovinos:

- Adulto: 1 ml de producto por cada 16 kg de peso vivo.
- Terneros: 1 ml de producto por cada 16 kg de peso vivo.

Equinos:

- Adulto: 1 ml de producto por cada 16 kg de peso vivo.
- Potrillos: 1 ml de producto por cada 16 kg de peso vivo.

Porcinos:

- Adulto: 1 ml de producto por cada 16 kg de peso vivo.
- Lechones: 1 ml de producto por cada 16 kg de peso vivo.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- Se debe tener en cuenta que en raras ocasiones pueden presentarse reacciones anafilácticas o de hipersensibilidad después de la aplicación del producto.
- Como en todas las formulaciones de sulfonamidas y trimetoprim, se debe considerar que existe la posibilidad potencial de que se presenten daños al riñón, al hígado o al sistema hematopoyético.
- No aplicar en animales hipersensibles a los componentes de la fórmula.
- No debe administrarse si hay lesión y/o disfunción renal.
- En animales preñados no produce aborto.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- El producto se debe aplicar muy lentamente, tomándose el tiempo que sea necesario.
- Al primer signo de intolerancia se debe suspender la administración para evitar el riesgo de choque.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 077

VERSIÓN: V01

TIEMPO DE RETIRO

Bovinos:

- Carne: 10 días.
- Leche: 4 días.

Porcinos:

- Carne: 10 días.

Equinos:

- Carne: 10 días.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.