



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 078

VERSIÓN: V01

TRIDEX 20%®

Suspensión oral

Antiparasitario interno

N° Registro: F.08.02.N.0893

COMPOSICIÓN

Triclabendazol	12.5 g
Levamisol HCl	7.5 g
Excipientes c.s.p.	100.0 ml

USO

Bovinos y ovinos.

INDICACIONES DE USO

TRIDEX 20%® está indicado para el control simultáneo de infestaciones causadas por formas maduras e inmaduras de vermes gastrointestinales: *Haemonchus*, *Ostertagia* (adultas y larvas en desarrollo), *T. axei*, *Cooperia*, *Trichostrongylus*, *Nematodirus*, *Bunostomum*, *Oesophagostomum*, *Chabertia* y pulmonares: *Dictyocaulus spp*; así como todas las formas de fasciolosis: estadios inmaduros y tempranos, inmaduros y adultos de *Fasciola hepática* y *Fasciola gigantita*, en el ganado bovino y ovino.

DOSIFICACIÓN

Bovino y ovino: 1 ml del producto por cada 10 kg de peso vivo.

Dosis única.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 078

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No utilizar en animales lactantes.
- No utilizar vacas en producción.
- Usar con precaución en animales gestantes. 11
- Debe de usarse con precaución en animales muy débiles o con deficiencia renal o hepática.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.
- Usar envases limpios para su dosificación
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar

TIEMPO DE RETIRO

Bovinos y ovinos: Carne: 28 días.

Leche: No autorizada para emplear en animales productores de leche para consumo humano

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.