



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 084

VERSIÓN: V01

FULLMETRIN

Solución externa

Antiparasitario externo

N° Registro: F.101.058.N.00006

COMPOSICIÓN

Cipermetrina	100 mg
Ethion	400 mg
Butóxido de piperonilo	100 mg
Excipientes	1 ml

USO

Bovinos, ovinos, caprinos , camélidos sudamericanos y equinos.

INDICACIONES DE USO

Fullmetrin es un ectoparasiticida indicado para el control y tratamiento de garrapatas como la común del bovino, insectos picadores como la mosca del cuerno, mosca brava, mosquitos y contra piojos y pulgas en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos y equinos. Este producto está formulado para baños de inmersión, de aspersión y fumigación de instalaciones pecuarias.

*Garrapatas: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Amblyomma cajennense*, *Haemophilus spp.*, *Hyalomma truncatum*.

*Insectos picadores (moscas): *Haematobia spp.*, *Stomoxys spp.*, *musca spp.*, *Lyperosia spp.*, *Callitroga spp.*,

*Piojos y pulgas: *Damalinea spp.*, *Haematopinus spp.*, *Linognathus spp.*, *Ctenocephalides spp.* y *Trichodectes spp.*, *Melophagus ovis*.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 084

VERSIÓN: V01

DOSIFICACIÓN

Baños por inmersión:

- Pie de baños: 1 L / 1000 L de agua
- Refuerzo y reposición: 1 ½ L / 1000 L de agua.
- Refuerzo en seco: ½ L cada vez que el nivel de baño descienda 1000 L.

Baños por aspersión:

- Pie de baños: 1 L / 1000 L de agua.

Fumigaciones de instalaciones pecuarias:

- 1 ml / L de agua (1 litro de solución para 10 - 15 m²)

Uso externo (baños de inmersión, aspersión e instalaciones pecuarias).

*En los baños, los animales son tratados como una manada y bañados uno por uno. Asegúrese un completo mojado del animal.

Los baños para controlar garrapatas en zonas infestadas se dan cada 21 días a todos los animales.

En caso de desplazamiento de animales de una zona infestada a una zona limpia son 2 baños con un intervalo de 9 días.

En caso de planes de erradicación: Baños cada 21 días.

En caso de baños preventivos: 2 baños con 9 días de intervalo. Seguir las recomendaciones del médico veterinario.

La duración del tratamiento estará condicionada por el comportamiento epidemiológico del ectoparásito (garrapata, piojo, ácaro) según la zona. Seguir las recomendaciones del médico veterinario.

El producto debe ser mezclado en agua, agitar intensamente para homogeneizar antes de iniciar los baños.

Si se usa en bañaderos por inmersión, deben estar correctamente cubcados y limpios antes de utilizar el producto. Los animales deben pasar por el bañadero por 15 segundos como mínimo, y sumergir la cabeza hasta 3 veces.

La cantidad de animales que pasará por el bañadero es entre 70 - 100. Hay que tener un registro del pasaje de animales y el nivel del agua después de cada pasaje, de las reposiciones y los refuerzos.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 084

VERSIÓN: V01

Si se usa en baños por aspersión, usar una bomba de espalda (pulverizadora) que deben estar correctamente limpios antes de utilizar el producto. Al momento del baño, rociar completamente el cuerpo del animal.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No aplicar sobre animales mojados.
- No bañar animales cansados y/o sedientos. Por seguridad, el ganado debe reposar y beber agua antes del baño.
- No tratar a los animales con heridas o lesiones abiertas.
- No usar en animales gestantes ni lactantes.
- Durante el tratamiento de los animales, se recomienda evitar la exposición a intensas horas de calor, frío y lluvias.
- Tener con cuidado a animales jóvenes, débiles y los que son bañados por primera vez.
- No aplicar a terneros que pesen menos de 100 kg.
- Aplique el producto a todo el hato en un solo tiempo.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Medicamento especial de uso veterinario externo.
- El producto no debe mezclarse con otros productos de distintos a los principios activos, ya que pueden neutralizarse o disminuir su eficacia. Además de crear resistencia.
- Este producto no es compatible con productos altamente alcalinos. Ni con otros organofosforados.
- Agitar antes de usar
- Aplicar el producto en un ambiente ventilado.
- Aplicar el producto con guantes, protección de ojos, de cara y vestimenta adecuada. Se recomienda el uso de mascarillas para evitar el ingreso a las vías respiratorias.
- Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. En caso suceda, lávese con abundante agua y jabón.
- Evite aspirar e ingerir el producto al momento de aplicarlo.
- Lávese las manos inmediatamente después del uso del producto.
- Evite el contacto con el pelo del animal después de la aplicación del producto.
- Personas con hipersensibilidad a los principios activos deben evitar contacto con el producto.
- Evitar su liberación al medio ambiente acuático.
- No reutilizar el envase, destruirlo.
- Este producto no debe ser manipulado por mujeres gestantes o en lactación.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 084

VERSIÓN: V01

- Mantener fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto a productos de consumo.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.

PERIODO DE RETIRO

- Leche: 2 días después del último tratamiento
- Carne: 15 días después del último tratamiento

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.