



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 094

VERSIÓN: V01

CURAMICINA GALLUS®

Polvo Oral

Antibiótico

N° Registro: F.03.70.N.1708

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina HCl	5.5 g.
Excipientes c.s.p.	100 ml.

USO

Aves y porcinos.

INDICACIONES DE USO

CURAMICINA GALLUS® tiene un amplio espectro de acción sobre bacterias Gram positivas, Gram negativas, aerobios y anaerobios. Específicamente está indicado para las siguientes enfermedades:

Pollos de Carne, Ponedoras y Pavos: *Chlamydophila*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella spp.*

Porcinos: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Lawsonia intracellularis*, *H. parasuis*, *E. Coli*, *Salmonella spp.*

DOSIFICACIÓN

Disolver 100 g de Curamicina Gallus (Equivalente a 5.5 g Oxitetraciclina HCl) en 5 litros de agua de bebida (equivalente a 1.1 mg/ml de agua), agitar para homogeneizar y dosificar:

- Aves: 46 ml por Kg de peso vivo.

- Cerdos: 36 ml por kg de peso vivo

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 094

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- A dosis recomendada no existen efectos adversos.
- Es compatible con otros alimentos.
- No administrar en conjunto con electrolitos (quelación del calcio)

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.
- Usar envases limpios para su dosificación.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.

PERIODO DE RETIRO

- Pollos de carne: 7 días.
- Gallinas ponedoras: 0 - 60 horas
- Pavos: 7 días.
- Porcinos: 10 días

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.