



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – A04

VERSIÓN: V01

GOLFIN 100 EC®

Concentrado emulsionable

Protección de cultivos

N° Registro: PQUA N° 728-SENASA

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Alfacipermetrina	100g/L
Naphta	794g/L
Aditivos c.s.p.	1 L

INDICACIONES DE USO

GOLFIN 100 EC® Es un insecticida de amplio espectro. Actúa por contacto e ingestión. Es de baja toxicidad para el hombre y animales de sangre caliente. Se emplea en el control de una amplia gama de insectos en diversos cultivos como: Repollo, Granadilla, Coliflor, Brócoli, Sandía, Zapallo, Zapallito italiano, Melón, Alcachofa, Ají, Alfalfa, Apio, Avena, Cebada, Espárrago, Frijol, Haba, Lechuga, Papa, Pimentón, , Tomate, Ajo, Arveja, Flores de invernadero y de campo, Alcachofa, Alfalfa, Arveja, Cebada, Cebolla, Papa, , Remolacha, frutales, etc. GOLFIN 100 EC® puede aplicarse con cualquier equipo de aspersión terrestre de alto o bajo volumen, con el volumen suficiente de agua para poder cubrir todo el follaje en forma uniforme.

DOSIFICACIÓN

Sistema de preparación y aplicación: Realizar previa calibración del equipo de aplicación para calcular la cantidad exacta de caldo a preparar y utilizar, y no tener remanentes de aplicación. Llenar el tanque aplicación a la mitad de su capacidad; en un recipiente aparte y destinado específicamente para ello, diluirla dosis recomendada del producto y agregarlo al tanque de aplicación, remover y terminar de completar la cantidad de agua necesaria para la aplicación. Realizar las aplicaciones en los horarios donde no haya vientos fuertes ni cuando el rocío de la mañana este presente. Evitar aplicar si hay indicios de lluvia.

Consulte con un ingeniero agrónomo.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – A04

VERSIÓN: V01

Cultivo	Plagas	Dosis	Dosis HA	Periodo de carencia (días)	LMR (PPM)
	Nombre común/Nombre científico				
Maíz	<i>Cogollero/Spodoptera frugiperda</i>	1.5	0.2 – 0.25	15	0.3

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar el producto a una temperatura de 15 a 30 °C, en un lugar fresco y seco.
- Proteger de la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
- No transportar ni almacenar junto a productos comestibles.
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado, no respire vapor o aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, ni beber ni fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la preparación y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de cada aplicación quitarse la ropa e implementos de manipulación y lavarlos por separado, bañarse con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que contenga plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicaciones hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.