



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – A05

VERSIÓN: V01

PAPAKURO®

Suspensión concentrada

Protección de cultivos

N° Registro: PQUA N° 2402-SENASA

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Fipronil	200 g/L
Aditivos	1 L

INDICACIONES DE USO

PAPAKURO®, debe ser aplicado en momentos oportunos para evitar daños extremos de plagas en los cultivos. PAPAKURO, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

Consulte con un ingeniero agrónomo.

DOSIFICACIÓN

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/Cil	PC Días	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN			
Cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	Thrips	0.2 – 0.25	21	0.02
Papa	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	Gorgojo de los Andes	0.25 – 0.30	14	0.02

*Realizar 4 aplicaciones por campaña cuando se observen la presencia de plaga en:



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – A05

VERSIÓN: V01

En papa, realizar la primera aplicación luego de la germinación de las plantas, segunda aplicación al aporque de las mismas, si fuera necesario y según las evaluaciones de campo se podrá programar hasta una tercera aplicación para el control del gorgojo los andes en plena tuberización de la planta.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar el producto a una temperatura de 15 a 30 °C, en un lugar fresco y seco.
- Proteger de la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
- No transportar ni almacenar junto a productos comestibles.
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado, no respire vapor o aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, ni beber ni fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la preparación y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de cada aplicación quitarse la ropa e implementos de manipulación y lavarlos por separado, bañarse con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que contenga plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicaciones hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.