



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – A17

VERSIÓN: V01

SUPER ABONO NPK 20-20-20®

Líquido Foliar
Nutrición de cultivos

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno	(N)	20%
Fósforo	(P)	20%
Potasio	(K)	20%
Azufre	(S)	Trazas
Zinc	(Zn)	Trazas
Magnesio	(Mg)	Trazas
Fierro	(Fe)	Trazas
Cobre	(Cu)	Trazas
Manganeso	(Mn)	Trazas
Calcio	(Ca)	Trazas
Boro	(B)	Trazas
Molibdeno	(Mo)	Trazas

INDICACIONES DE USO

SUPER ABONO NPK 20-20-20® es un fertilizante foliar perfectamente balanceado con macro nutrientes de (NPK) enriquecido con elementos menores de mayor asimilación a la planta, está indicado el uso de manera diversificada en todos los cultivos y en el período vegetativo de los cultivos para aumentar el rendimiento y calidad de cosecha en todos los cultivos, además previene el estrés causado por granizadas, helada, sequías, etc.

SUPERABONO NPK 20-20-20® está indicado para los siguientes cultivos:

- Hortalizas (espinaca, acelga, lechuga, berro, perejil, apio, cebolla, zanahoria, ajo, brócoli, pepinillo, etc.)
- Tuberosas (papa, camote, yuca, oca, mashua, olluco, maca, araccacha, yacón, etc.)
- Cereales, Leguminosas y Granos (frijol, maíz, avena, trigo, soya, arroz, quinua, kiwicha, cañihua, linaza, haba, etc.)
- Cucurbitáceas (calabaza, melón, sandía, zapallo, zapallito)

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe

- Ornamentales, Frutales, Industriales y otros (flores, granadilla, alfalfa, trébol, cacao, café, maní, ajonjolí, uva, manzano, durazno, plátano, naranjo, etc.)

DOSIFICACIÓN

CULTIVO	DOSIS / 200 L DE AGUA	DOSIS POR Ha	APLICACIÓN
Algodón.	1000 ml	2 L	1º Después de deshoje asociado con MILAGRO GIBB para mejorar el enraizamiento. 2º Antes de formación de botón floral
Cítricos, mango, pera, manzano, melocotón. Plátanos, naranja, vid, cacao, café, mandarina.			1º Inicio de brote de hojas. 2º Después de 25 días de la primera aplicación, en ambos casos asociado con MILAGRO GIBB.
Papa, ají, rocoto, camote, oca, olluco, mashua, tomate, pimiento, yuca, ajo, cebolla, maca, paprika.	1000 ml	2 L	1º En proceso de crecimiento asociados con MILAGRO GIBB + SEMBRADOR MIX. 2º Después de 20 días de la primera aplicación
Frijol, pallar, haba, garbanzo, alverja, maíz.	1000 ml	2 L	1º Primera aplicación al inicio del crecimiento, asociado con MILAGRO GIBB 2º Repetir a los 20 días después de la primera aplicación
Apio, coliflor, lechuga, zanahoria, col, albahaca, perejil, brócoli, acelga, pepinillo, alcachofa, espárrago.	1000 ml	2 L	1º Primera aplicación al inicio del desarrollo. 2º Repetir la aplicación a los 10 días. 3º Repetir a los 10 días después de la segunda aplicación
Trigo, cebada, centeno, avena, arroz, linaza, soya, quinua, kiwicha, cañihua.			1º Inicio de macollamiento. 2º Pleno macollamiento.
Calabaza, melón, sandía, zapallo, zapallito.	1000 ml	2 L	1º A los 20 días después de la germinación. 2º Repetir luego de 25 días
Flores, alfalfa, trebol, avena, forrajera, ray grass, etc.	1000 ml	2 L	1º A los 8 días después del corte. 2º En pleno crecimiento, según las especies.
Granadilla	1000 ml	2 L	1º Periodo de crecimiento, asociado con MILAGRO GIBB. 2º Antes de botón floral a cartucho, asociado con MILAGRO GIBB.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – A17

VERSIÓN: V01

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Almacenar el producto a una temperatura de 15º a 30º C, en un lugar fresco y seco.
- Proteger de la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
- No transportar ni almacenar junto a productos comestibles.
- En caso de ingestión inducir al vómito.

