



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 088

VERSIÓN: V01

VEDOXIL SOLUCIÓN®

Solución Oral

Antibiótico

N° Registro: F.082.032.N.00931

COMPOSICIÓN

Doxiciclina hclato 57.7 mg
(57.7 mg de doxiciclina hclato equivale 50 mg doxiciclina base)
Excipientes c.s.p. 1 mg

USO

Caninos y felinos.

INDICACIONES DE USO

Vedoxil Solución, antibiótico de amplio espectro, indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones respiratorias como neumonías, bronconeumonías, rinitis y sinusitis; también de faringitis, traqueitis y otitis. Infecciones de la piel (abscesos, forúnculos, celulitis), infecciones gastrointestinales (diarreas), infecciones oculares (clamidias) e infecciones genitourinarias (metritis y cistitis). Además, en casos de ehrlichiosis y micoplasmosis.

La doxiciclina está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por los siguientes agentes etiológicos:

*Bacterias Gram negativas: *Haemobartonella felis y canis*; *Bordetella bronchiseptica*; *Brucella canis*; *Escherichia coli*; *Chlamydia psittaci*; *Klebsiella spp*; *Fusobacterium fusiforme*; *Mycoplasma spp*; *Chlamydia trachomatis Rickettsiae*; *Ehrlichia canis*; *Haemophilus spp*; *Pasteurella multocida*; *Enterobacter aerogenes*; *Shigella spp*; *Bacteroides spp*; *Salmonella spp*; *Campylobacter jejuni*.

*Bacterias Gram positivas: *Streptococcus pyogenes*; *Streptococcus spp*; *Staphylococcus spp*; *Staphylococcus aureus*; *Corynebacterium spp*; *Clostridium tetani*; *Actinomyces spp*; *Bacillus anthracis*.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 088

VERSIÓN: V01

*Otros microorganismos: *Leptospira spp*; *Entamoeba spp*; *Balantidium coli*; *Plasmodium*; *Treponema pallidum*; *Borrelia spp*; *Propionibacterium acnes*.

DOSIFICACIÓN

Canino y felino: 0.1 - 0.2 ml/kg. Vía oral.

Se recomienda cada 24 horas y la duración del tratamiento puede variar de 5 a 21 días, pero dependerá del caso clínico y el criterio del médico veterinario

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- Se debe administrar después del alimento porque causa irritación del estómago.
- No administrar a hembras gestantes, ya que causa malformaciones en el feto
- No administrar a neonatos (cachorros o mininos)
- Ajustar la dosis de doxiciclina en caso exista insuficiencia hepática.
- No es necesario ajustar la dosis de doxiciclina en caso de insuficiencia renal.
- Tampoco debe administrarse en animales que sigan tratamientos con fenitoína o barbitúricos.
- No administrar si hay evidencia de esofagitis o disfagia.
- No utilizar en animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Producto exclusivo para uso veterinario en las especies indicadas.
- Este producto debe ser recetado y monitoreado durante el tratamiento por un médico veterinario.
- No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.