

NAVAJERO®

Tableta

Antiparasitario interno y externo

N° Registro: F.009.031.N.00558

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ivermectina	1 mg
Praziquantel	25 mg
Fenbendazol	40 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta

INDICACIONES DE USO

Navajero, antiparasitario de amplio espectro indicado para el control y tratamiento de endoparásitos, entre ellos, nemátodos (traqueo-pulmonares, gastroentéricos y renales), cestodos (tenias); además, controla ectoparásitos como piojos chupadores (piojillos) y ácaros de las patas, ácaros rojos. Indicado en gallos de combate.

*Céstodos: *Davainidae proglottina*, *Railletina spp.*, *Hymenolepis spp.*

*Nemátodos: *Ascaridia galli*, *Heterakis spp.*, *Capillaria spp.*

*Parásitos externos: *Dermanyssus gallinae*, *Ornithonyssus spp.*, *Menacanthus stramineus*, *Menopon gallinae*, *Gonicotes gallinae*, *Goniodes gigas*, *Cuclotogaster heterographus*, *Lipeurus capones*, *Knemidocoptes spp.*, *Argas persicus*.

DOSIFICACIÓN

Aves de combate: 1 tableta cada 2.5 kg.

Dosis única. Vía oral

Se recomienda establecer un programa de desparasitación, de acuerdo al nivel de infestación parasitaria y del criterio del médico veterinario.

*Para *Ascaris sp.*: repetir tratamiento en 10 días.

*Para *Capillaria sp.*: repetir durante 3 días.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 115

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar a animales sensibles a los principios activos y/o excipientes.
- No utilizar en aves débiles o convalecientes.
- Implementar prácticas de limpieza en nidos, pisos, paredes, jaulas y techos.
- No mezclar aves sanas / tratadas con aves infectadas / enfermas.
- No utilizar en aves en producción de huevos para consumo humano.
- No utilizar de manera simultánea con amitraz. Ni tampoco con anestésicos ni tranquilizantes, ya que puede alterar su efecto.
- Se recomienda administrar este medicamento solo sin otros tratamientos alternos.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Producto exclusivo de uso veterinario en la especie indicada.
- Lávese las manos con jabón y agua después de utilizar el producto.
- No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.