



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 016

VERSIÓN: V01

TIDOXIL®

Solución Inyectable

Antibiótico

N° Registro: F.082.001.N.00872

COMPOSICIÓN

Doxiciclina (hclato) 200 mg

Tilosina (tartrato) 50 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

USO

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos y aves (pollo, gallina y pavo).

INDICACIONES DE USO

Tidoxil® es una combinación antibiótica de amplio espectro y de rápida acción. Está indicado para tratamiento de neumonías, bronconeumonías, pleuroneumonías, pasteurelosis, ERC, difteria, infecciones podales, metritis. También para agalactia, disentería porcina, erisipela porcina, artritis micoplasmática y coriza infecciosa, cólera aviar.

Generan un prolongado efecto contra bacterias Gram positivas y Gram negativas:

Gram positivas: *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Neumococos sp.*

Gram negativos: *Haemophilus spp.*, *Actinobacilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.*, *Moraxella spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*

DOSIFICACIÓN

Bovino, porcino, ovino y caprino: 1 ml / 10 kg.

Se recomienda utilizar 1 dosis por día de 3 a 5 días.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 016

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar más de 10 ml en el punto de inoculación
- No administrar a equinos
- No usar en animales con alteraciones hepáticas.
- En bovinos, se han observado casos de hipotensión y colapso súbito por vía intravenosa rápida.
- Puede ocasionar trastornos gastrointestinales después de la administración parenteral, desde una enteritis inespecífica a enterocolitis con toxicosis, colapso, deshidratación e hipopotasemia.
- La inyección intramuscular puede ser dolorosa produciendo inflamación y necrosis en el punto de inoculación.
- Las tetraciclinas, pueden ocasionar reacciones alérgicas y de fotosensibilidad.
- Puede observarse alteración de los mecanismos normales de defensa: inhiben la quimiotaxis y fagocitosis leucocitaria cuando se encuentran presentes en concentraciones elevadas en los sitios de infección.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- No usar en animales con hipersensibilidad conocida a las tetraciclinas y/o alguno de los excipientes.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a las tetraciclinas deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- Manipular con cuidado para evitar la autoinyección accidental. En caso suceda, acudir a un médico inmediatamente.
- Evite el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas. En caso de exposición, lavar con abundante agua.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 016

VERSIÓN: V01

PERIODO DE RETIRO

Bovino:

*Carne: 28 días.

*Leche: 6 días.

Porcino: 14 días.

Ovino, caprino y camélido: 28 días.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

