



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 096

VERSIÓN: V01

# ENRORAL 50 MG<sup>®</sup>

Tableta oral

Antibiótico

Registro: F.082.031.N.00966

### COMPOSICIÓN

Cada tableta de 300 mg, contiene:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enrofloxacin clorhidrato | 50 mg     |
| Excipientes c.s.p.       | 1 tableta |

### USO

Caninos y felinos.

### INDICACIONES DE USO

Enroral 50 mg, antibiótico para caninos y felinos. Indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas, genitourinarias, así como infecciones de la piel, heridas y otitis externa. Todos estos causados por bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, los agentes etiológicos son los siguientes: *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *pseudomonas spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Yersinia spp.*

### DOSIFICACIÓN

Canino y felino: 1 tableta / 10 kg. Vía oral.

El intervalo de dosis se recomienda cada 24 horas dependiendo del caso clínico. La duración del tratamiento, administrar por 5 - 7 días. En casos crónicos y severos, el tratamiento puede prolongarse hasta 10 días, pero dependerá del criterio del médico veterinario

Para una dosificación correcta, se debe determinar el peso corporal del animal para evitar infradosificación.

Las tabletas pueden ser administradas directamente en la boca o mezcladas con la comida.

[www.agrofarma.pe](http://www.agrofarma.pe)

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú  
Teléfono: (511) 258 1347  
Email: [ventas@agrofarma.pe](mailto:ventas@agrofarma.pe)



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 096

VERSIÓN: V01

### CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No usar en cachorros o en perros en crecimiento (perros de menos de 12 meses en razas pequeñas o de menos de 18 meses en razas grandes), ya que puede causar alteraciones en el cartílago epifisario.
- No utilizar en gatos menores de 8 semanas de edad.
- No usar en animales con trastorno del crecimiento cartilaginoso.
- No usar en animales con historial clínico de epilepsia o con alteraciones nerviosas relacionadas con el GABA, ya que el medicamento puede causar estimulación del SNC.
- No administrar en caso de hipersensibilidad conocida a las fluoroquinolonas o alguno de los excipientes.

### PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Producto exclusivo para uso veterinario en caninos y felinos. No usar en conejos.
- Este producto debe ser recetado y monitoreado durante el tratamiento por un médico veterinario.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a las fluoroquinolonas deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- Lávese las manos antes y después de manipular el medicamento.
- En caso de ingestión accidental consulte con un médico inmediatamente y muéstrela el prospecto o la etiqueta.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.

### CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

