



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 122

VERSIÓN: V01

PIROX[®]

Solución inyectable

Antiparasitario

N° Registro: F.008.001.N.01324

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cada 100 ml contiene:

Diaceturato de diminaceno 70 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

INDICACIONES DE USO

PiroX está indicado para el control y tratamiento en infecciones por babesias (piroplasmosis) y tripanosomas, causadas por los siguientes agentes: *Babesia bovis*, *Babesia bigemina*, *Babesia caballos*, *B. ovis*, *B. equi*, *B. motasi*, *B. divergens*, *Tripanosoma rhodesiense*, *Tripanosoma congolense*, *T. brucei*, *T. equidernun*, *T. envasi* en bovinos, equinos, ovinos, caprinos.

DOSIFICACIÓN

Bovinos, equino, ovinos y caprinos: 1 ml de producto por cada 20 kg de peso vivo. Vía intramuscular profunda.

Administrar cada 24 horas, si requiere repetir la dosis, se deja al criterio del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No aplicar por vía intravenosa, porque puede provocar hipotensión.
- No administrar a animales con hipersensibilidad a los activos.
- No usar en animales con insuficiencia renal y hepática.
- En la zona de aplicación podría ocasionar dolores y reacciones locales, los cuales ceden rápidamente.
- Se recomienda no aplicar más de 10 mL por sitio de inyección.
- A la dosis indicada, puede realizarse la administración en cualquier etapa de la gestación o durante el periodo de lactancia.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 122

VERSIÓN: V01

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Producto exclusivo para uso veterinario en las especies indicadas. No usar en camélidos.
- Este producto debe ser recetado y monitoreado durante el tratamiento por un médico veterinario.
- Lávese las manos antes y después de manipular el medicamento.
- No mezclar en el envase con otros productos.
- Mantener el producto en su empaque original hasta el día de su empleo.
- En caso de inyección accidental, consulte con su médico inmediatamente y muéstrele el prospecto.
- No coma, beba ni fume durante la aplicación del producto.

PERIODO DE RETIRO

- Carne: 21 días
- Leche: 3 días.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

